

MET 11801

Matematikk for siviløkonomer

Institutt for Samfunnsøkonomi

Utlevering:	28.02.2019	Kl. 09:00
Innlevering:	07.03.2019	Kl. 12:00

For mer informasjon om formalia, se eksamensoppgaven.

Fagoppgave 1 i MET1180¹ - Matematikk for siviløkonomer

28. feb. – 7. mars 2019

LØSNINGSFORSLAG

Oppgave 1

(a)

$$250\,000 \cdot \frac{1}{e^{0,029}} + 250\,000 \cdot \frac{1}{(e^{0,029})^2} + \dots + 250\,000 \cdot \frac{1}{(e^{0,029})^{n-1}} + 250\,000 \cdot \frac{1}{(e^{0,029})^n}$$

(b) Summen av den geometriske rekken: $250\,000 \cdot \frac{1}{(e^{0,029})^n} \cdot \frac{(e^{0,029})^n - 1}{e^{0,029} - 1}$.

For $n = 10$: 2 138 826,69 for $n = 20$: 3 739 232,79 for $n = 40$: 5 832 823,11

for $n = 80$: 7 661 332,56 for $n = 1000$: 8 496 293,81.

(c) $250\,000 \cdot \frac{1}{(e^{0,029})^n} \cdot \frac{(e^{0,029})^n - 1}{e^{0,029} - 1} = 250\,000 \cdot \frac{1 - (e^{0,029})^{-n}}{e^{0,029} - 1}$ nærmer seg mer og mer
 $250\,000 \cdot \frac{1}{e^{0,029} - 1} = 8\,496\,293,813370\dots$ når n blir større og større.

Oppgave 2

(a) Vi faktorerer hver av de to andregradspolynomene og multipliserer tilsist alle de lineære faktorene. Vi har $6x^2 - 36 = 6(x^2 - 6) = 6(x + \sqrt{6})(x - \sqrt{6})$ og

$\frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{187}{2} = \frac{1}{2}(x - 11)(x + 17)$. Dermed er

$$(6x^2 - 36)(\frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{187}{2}) = 3(x + \sqrt{6})(x - \sqrt{6})(x - 11)(x + 17).$$

(b) Vi prøver oss frem og finner at $x = -1$ er en rot i $x^4 - 20x^3 + 78x^2 + 220x + 121$;

$(-1)^4 - 20(-1)^3 + 78(-1)^2 + 220(-1) + 121 = 1 + 20 + 78 - 220 + 121 = 0$. Så bruker vi polynomdivisjon og finner

$$\begin{array}{r} (x^4 - 20x^3 + 78x^2 + 220x + 121) : (x + 1) = x^3 - 21x^2 + 99x + 121 \\ \underline{-x^4 \quad -x^3} \\ -21x^3 + 78x^2 \\ \underline{21x^3 + 21x^2} \\ 99x^2 + 220x \\ \underline{-99x^2 - 99x} \\ 121x + 121 \\ \underline{-121x - 121} \\ 0 \end{array}$$

Vi prøver oss frem og finner at $x = -1$ er en rot i $x^3 - 21x^2 + 99x + 121$;

$(-1)^3 - 21(-1)^2 + 99(-1) + 121 = -1 - 21 - 99 + 121 = 0$. Så bruker vi polynomdivisjon og finner

$$\begin{array}{r} (x^3 - 21x^2 + 99x + 121) : (x + 1) = x^2 - 22x + 121 \\ \underline{-x^3 \quad -x^2} \\ -22x^2 + 99x \\ \underline{22x^2 + 22x} \\ 121x + 121 \\ \underline{-121x - 121} \\ 0 \end{array}$$

Endelig har $x^2 - 22x + 121$ dobbeltroten $x = 11$. Dette gir faktoriseringen

$$x^4 - 10x^3 - 63x^2 + 340x - 364 = (x + 1)^2(x - 11)^2$$

¹Eksamenskoder MET11801 og MET11804

Oppgave 3

- (a) Vi multipliserer hver side av likningen med $(x + 1)(x + 2)(x + 3)$ og får likningen $(x + 2)(x + 3) + 2(x + 1)(x + 3) = 3(x + 1)(x + 2)$ med $x \neq -1, -2, -3$. Vi løser opp og trekker sammen og får $4x + 6 = 0$ som gir $x = -\frac{3}{2}$.
- (b) Vi setter $u = x^3$ og får andregradslikningen $u^2 - 19u = 216$. Vi fullfører kvadratet: $(u - 9,5)^2 = 216 + 9,5^2 = 306,25$ som gir $u = 9,5 \pm 17,5$. Fordi $u = x^3 \geq 0$ får vi $x = 3$ og $x = -2$.
- (c) Vi multipliserer hver side av likningen med $(2 - \sqrt{x})(2 + \sqrt{x}) = 4 - x$ og får $7(2 + \sqrt{x}) + 7(2 - \sqrt{x}) = 4 - x$ og trekker sammen: $28 = x - 4$ som gir $x = 32$.
- (d) Vi isolerer ett av rotuttrykkene: $\sqrt{4 - 3x} = 7 - \sqrt{5 - x}$ og kvadrerer vs og hs. Det gir $4 - 3x = 49 + 14\sqrt{5 - x} + 5 - x$. Vi isolerer rotuttrykket og deler på 2: $7\sqrt{5 - x} = x + 25$. Så kvadrerer vi vs og hs: $245 - 49x = x^2 + 50x + 625$, dvs $x^2 + 99x = -380$. Vi løser andregradslikningen ved å fullfører kvadratet: $(x + \frac{99}{2})^2 = (\frac{91}{2})^2$ som gir $x = -4$ eller $x = -95$. Vi må teste om dette gir løsninger av den opprinnelige likningen.
 $x = -4$ vs: $\sqrt{4 - 3 \cdot (-4)} - \sqrt{5 - (-4)} = 4 - 3 = 1$, hs: 7. De er ulike så $x = 0$ er ikke en løsning av den opprinnelige likningen.
 $x = -95$ vs: $\sqrt{4 - 3 \cdot (-95)} - \sqrt{5 - (-95)} = 17 - 10 = 7$, hs: 7. De er like så $x = -95$ er den eneste løsningen på likningen.

Oppgave 4

- (a) Vi beregner fremtidsverdien av betalingsstrømmen om 6 år (i millioner):

$$70 \cdot 1,12^5 + 70 \cdot 1,12^4 + 50 \cdot 1,12^3 + 50 \cdot 1,12^2 + 50 \cdot 1,12 + 50 = 472,48$$

Patentet må altså koste 472,48 millioner for at internrenten skal bli 12%.


- (b) Vi prøver oss frem og finner at $r = \underline{14,07\%}$ gir nåverdien

$$-(70 \cdot 1,1407^5 + 70 \cdot 1,1407^4 + 50 \cdot 1,1407^3 + 50 \cdot 1,1407^2 + 50 \cdot 1,1407 + 50) + \frac{500}{1,1407^5} \approx 0$$

Internrenten er derfor tilnærmet 14,07%.

Oppgave 5

- (a) Fordi vi har 0 på den ene siden av ulikheten og teller og nevner er førstegradsuttrykk kan vi bruke fortegnsskjema: Se figur 1.




Figur 1: Fortegnsskjema a

Vi leser av løsningene: $x < -\frac{5}{3}$ eller $x \geq \frac{5}{2}$. Alternativ skrivemåte: $x \in \langle -\infty, -\frac{5}{3} \rangle \cup [\frac{5}{2}, \infty)$.


- (b) Vi legger til 6 på begge sider for å få 0 på den ene siden av ulikheten: $x(5 - x) + 6 > 0$. Så må vi løse opp og trekke sammen: $-x^2 + 5x + 6 > 0$. Multipliserer med -1 på begge sider: $x^2 - 5x - 6 < 0$. Vi faktorerer vs og får $(x + 1)(x - 6) < 0$. Nå kan vi bruke fortegnsskjema: Se figur 2.

Vi leser av løsningene: $\underline{-1 < x < 6}$. Alternativ skrivemåte: $x \in \langle -1, 6 \rangle$.



Figur 2: Fortegnsskjema b

- (c) Vi legger til 1 på begge sider for å få 0 på den ene siden av ulikheten: $\frac{1+4x-x^2}{x^2-9x+14} + 1 > 0$. Så multipliserer vi 1 med $\frac{x^2-9x+14}{x^2-9x+14}$ (som er lik 1 så ingenting endres) for å få samme nevner: $\frac{1+4x-x^2}{x^2-9x+14} + \frac{x^2-9x+14}{x^2-9x+14} > 0$. Så trekker vi sammen brøkene (samme nevner): $\frac{1+4x-x^2+x^2-9x+14}{x^2-9x+14} \leq 0$, trekker sammen telleren og faktoriserer nevneren: $\frac{5(3-x)}{(x-2)(x-7)} \leq 0$. Nå kan vi bruke fortegnsskjema: Se figur 3.



Figur 3: Fortegnsskjema c

Vi leser av løsningene: $x < 2$ eller $3 < x < 7$. Alternativ skrivemåte: $x \in (-\infty, 2) \cup (3, 7)$.

Oppgave 6

- (a) Nåverdien er $\frac{25 \text{ mill}}{1,15^7} = 9,40$ millioner.
 (b) Nåverdien av 25 millioner om 9 år med rente r er $\frac{25 \text{ mill}}{(1+r)^9}$. Vi får likningen $\frac{25 \text{ mill}}{1,15^7} = \frac{25 \text{ mill}}{(1+r)^9}$. Dette gir $(1+r)^9 = 1,15^7$, dvs $1+r = (1,15^7)^{\frac{1}{9}}$, dvs $r = 1,15^{\frac{7}{9}} - 1 = \underline{\underline{11,48\%}}$.
 (c) Se utregningen i (b).

Oppgave 7

- (a) Hvis $a = 0$ har vi ulikheten $1 \leq 0$ som ikke har noen løsninger (ikke oppfylt for noen x). Hvis $a > 0$ får vi fra et fortegnsskjema at ulikheten har løsninger: $x \in \langle 0, a \rangle$. Hvis $a < 0$ får vi fra et annet fortegnsskjema at ulikheten har løsninger: $x \in [a, 0)$. Altså har ulikheten løsninger for alle a ulik 0.
 (b) Vi skriver om venstresiden ved å fullfører kvadratet: $(x-a)^2 - a^2 + 3a < 0$, dvs $(x-a)^2 < a(a-3)$. Siden venstresiden alltid er større eller lik 0, må høyresiden være større enn 0. Da har ulikheten løsninger, nemlig $a - \sqrt{a(a-3)} < x < a + \sqrt{a(a-3)}$. Ulikheten $a(a-3) > 0$ har løsninger $a < 0$ eller $a > 3$ som også kan skrives som $a \in \langle -\infty, 0 \rangle \cup \langle 3, \infty \rangle$.

Oppgave 8

- (a) $\frac{1}{2}(x - (1 + \sqrt{2}))(x - (1 - \sqrt{2})) = \underline{\underline{\frac{1}{2}x^2 - x - \frac{1}{2}}}$
 (b) $\frac{1}{2}x(x - 2) = \underline{\underline{\frac{1}{2}x^2 - x}}$

Oppgave 9

- (a) Vi lar s være midtpunktet mellom røttene. Da er

$$f(x) = \frac{1}{2}(x - (s - 5))(x - (s + 5)) = \frac{1}{2}[x^2 - 2sx + (s^2 - 25)] = \frac{1}{2}x^2 - sx + \frac{1}{2}(s^2 - 25)$$
 røttene $x = s - 5$ og $x = s + 5$. Det finnes mange andre løsninger.
- (b) Vi lar k være dobbeltroten. Da er den største roten $k + 5$. Dermed blir uttrykket

$$(x - k)^2(x - (k + 5)) = x^3 - (3k + 5)x^2 + k(3k + 10)x - k^2(k + 5).$$
 Også her finnes det mange andre løsninger.

Oppgave 10

- (a) Vi ser at funksjonen har et nullpunkt for $x = 5$ og at symmetriaksen er midt mellom $x = 0$ og $x = 3$ fordi $f(0) = -2 = f(3)$, dvs at symmetriaksen er den vertikale linjen $x = \frac{3}{2}$. Dermed er det andre nullpunktet gitt av $x = \frac{3}{2} - \frac{7}{2} = -2$. Altså er uttrykket på formen $a(x + 2)(x - 5)$. For å bestemme a setter vi inn koordinatene til et punkt på grafen som vi lett kan bestemme koordinatene til (men ikke noen av nullpunktene fordi det leder til likninger $0 = 0$ som ikke forteller noe om a). Her er $(0, -2)$ en god kandidat. Da får vi $a(0 + 2)(0 - 5) = -2$ som gir $a = \frac{1}{5}$. Altså er uttrykket $f(x) = \frac{1}{5}(x + 2)(x - 5)$.
- (b) Denne funksjonen har ingen nullpunkter, men vi har tydelig vertikal symmetrilinje $x = 7$ og maksverdi -1 . Innsatt i standardformen $a(x - s)^2 + d$ gir dette $a(x - 7)^2 - 1$. For å bestemme a må vi sette inn et punkt på grafen som vi lett kan bestemme koordinatene til (men ikke toppunktet fordi det leder til likningen $0 = 0$ som ikke forteller noe om a). Her er $(3, -7)$ en god kandidat. Da får vi $a(3 - 7)^2 - 1 = -7$, dvs $a \cdot 16 - 1 = -7$ som gir $a = \frac{-6}{16} = -\frac{3}{8}$. Altså er uttrykket $f(x) = -\frac{3}{8}(x - 7)^2 - 1$.