

*... if I couldn't formulate a problem in economic theory mathematically, I didn't know what I was doing.*

R. Lucas

## Forelesning 8

torsdag 1. okt. kl 8-9.45 i C1-010.

Kap 3.6-8: Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomfunksjoner.

[L] 3.6.1-3


Flervalgseksamen 2018v oppg 7

[L] 3.7.1-3

[L] 3.8.1-4

**Oppgaver for veiledingstimene**  
**torsdag 24/9 kl 10-15(!) i CU1-067, C2-010 og C2-045 eller på Zoom**

**Oppgave 1** Finn likningene til sirklene i figur 1.




Figur 1: Sirkler a-c

**Oppgave 2** Bestem sentrum  $S$  og radius  $r$  til sirklene.

- |                                      |                                 |                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a) $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 5$       | b) $(x + 1)^2 + y^2 = 3$        | c) $(3x - 2)^2 + (3y - 4)^2 = 9$ |
| d) $x^2 + y^2 - 4x - 10y = -25$      | e) $x^2 + y^2 + 6x - 12y = -44$ |                                  |
| f) $25x^2 + 25y^2 - 20x - 30y = -12$ |                                 |                                  |

**Oppgave 3** Finn likningene til ellipsene i figur 2.



Figur 2: Ellipser a-d

**Oppgave 4** Bestem sentrum  $S$  og halvakser til ellipsen. Tegn en skisse av ellipsen.

a)  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

b)  $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{16} = 1$

c)  $16(x-1)^2 + 9(y-2)^2 = 144$

d)  $\frac{x^2}{2} + y^2 - 6y = -8$

e)  $9x^2 + 18x + 4y^2 = 27$

f)  $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y = 11$

g)  $25x^2 + 4y^2 - 100x - 40y = -100$

**Oppgave 5** Finn elementære argumenter for at:

a)  $f(x) = x^2$  med  $x \geq 0$  er strengt voksende

b)  $f(x) = \sqrt{x}$  er strengt voksende

c)  $f(x) = \frac{1}{x}$  med  $x > 0$  er strengt avtagende

**Oppgave 6** Finn skjæringspunktene mellom

a) linjen  $3x + 2y = 12$  og linjen  $-3x + 2y = -6$

b) linjen  $2x + y = 6$  og ellipsen i oppgave 4a


**Oppgave 7** Avgjør hvilke uttrykk (under) og grafer (i figur 3) som hører sammen.

1)  $x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + \frac{161}{10}$

2)  $\frac{x^5}{10} - \frac{3x^4}{2} + \frac{17x^3}{2} - \frac{45x^2}{2} + \frac{137x}{5} - 10$

3)  $-x^3 + 6x^2 - 11x + 7$

4)  $x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 26$



Figur 3: Grafene til fire polynomfunksjoner

**Fasit****Oppgave 1**

a)  $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$       b)  $(x - 12)^2 + y^2 = 25$       c)  $(x + 3,5)^2 + (y + 3)^2 = 6,25$

**Oppgave 2**


a) $S = (3, 4), r = \sqrt{5}$	b) $S = (-1, 0), r = \sqrt{3}$	c) $S = (\frac{2}{3}, \frac{4}{3}), r = 1$
d) $S = (2, 5), r = 2$	e) $S = (-3, 6), r = 1$	f) $S = (\frac{2}{5}, \frac{3}{5}), r = \frac{1}{5}$

**Oppgave 3**

a) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$	b) $\frac{(x-15)^2}{225} + \frac{(y-10)^2}{100} = 1$	c) $4(x + 2,5)^2 + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$
d) $\frac{x^2}{169} + \frac{(y-5)^2}{25} = 1$		

**Oppgave 4**

- a)  $S = (0, 0)$ , halvakser  $a = 3, b = 4$
- b)  $S = (1, 2)$ , halvakser  $a = 3, b = 4$
- c)  $S = (1, 2)$ , halvakser  $a = 3, b = 4$
- d)  $S = (0, 3)$ , halvakser  $a = \sqrt{2}, b = 1$
- e)  $S = (-1, 0)$ , halvakser  $a = 2, b = 3$
- f)  $S = (2, -1)$ , halvakser  $a = 3, b = 2$
- g)  $S = (2, 5)$ , halvakser  $a = 2, b = 5$



Figur 4: Ellipser a-d og e-g

**Oppgave 5**

- a) Anta  $0 \leq x_1 < x_2$ . Da er  $x_2 = x_1 + k$  for en positiv konstant  $k$ . Da er  $f(x_2) = (x_1 + k)^2 = x_1^2 + 2kx_1 + k^2$ . Sum og produkt av to positive tall er positive tall. Derfor er  $2kx_1 + k^2$  et positivt tall. Altså er  $f(x_1) = x_1^2 < x_1^2 + 2kx_1 + k^2 = f(x_2)$  og  $f(x) = x^2$  for  $x \geq 0$  er strengt voksende.
- b) Vi deler begge sider av ulikheten  $x_1 < x_2$  med det positive tallet  $x_2$  og får den ekvivalente ulikheten  $\frac{x_1}{x_2} < 1$ . Kvadratroten av et tall som er mindre enn 1 er selv mindre enn 1, dvs  $\sqrt{\frac{x_1}{x_2}} < 1$ . Men  $\sqrt{\frac{x_1}{x_2}} = \frac{\sqrt{x_1}}{\sqrt{x_2}}$ . Vi får ulikheten  $\frac{\sqrt{x_1}}{\sqrt{x_2}} < 1$  og når vi multipliserer hver side med det positive tallet  $\sqrt{x_2}$  får vi ulikheten  $f(x_1) = \sqrt{x_1} < \sqrt{x_2} = f(x_2)$ . Altså er  $f(x) = \sqrt{x}$  strengt voksende.
- c) Vi deler begge sider av ulikheten  $x_1 < x_2$  med det positive tallet  $x_2$  og får den ekvivalente ulikheten  $\frac{x_1}{x_2} < 1$ . Så deler vi denne ulikheten med det positive tallet  $x_1$  og får  $f(x_2) = \frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1} = f(x_1)$ . Altså er  $f(x) = \frac{1}{x}$  for  $x > 0$  strengt avtagende.

**Oppgave 6**

- a)  $(3, \frac{3}{2})$       b)  $(3, 0)$  og  $(\frac{15}{13}, \frac{48}{13})$

**Oppgave 7**

- $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 11x + 7$
- $g(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 26$
- $h(x) = \frac{x^5}{10} - \frac{3x^4}{2} + \frac{17x^3}{2} - \frac{45x^2}{2} + \frac{137x}{5} - 10$
- $i(x) = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + \frac{161}{10}$