

## Veiledningsoppgaver

### Oppgave 1.

Løs de bestemte integralene:

$$\begin{array}{lllll} \text{a) } \int_0^1 x \, dx & \text{b) } \int_0^1 x^2 \, dx & \text{c) } \int_0^1 x^3 \, dx & \text{d) } \int_0^1 e^x \, dx & \text{e) } \int_0^1 (e^x + e^{-x}) \, dx \\ \text{f) } \int_{-1}^1 x \, dx & \text{g) } \int_{-1}^1 x^2 \, dx & \text{h) } \int_{-1}^1 x^3 \, dx & \text{i) } \int_{-1}^1 e^x \, dx & \text{j) } \int_{-1}^1 (e^x + e^{-x}) \, dx \end{array}$$

### Oppgave 2.

Løs de bestemte integralene:

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \int_0^1 x e^x \, dx & \text{b) } \int_0^1 x \ln(x^2 + 1) \, dx & \text{c) } \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 5x + 6} \, dx & \text{d) } \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 4x + 4} \, dx \\ \text{e) } \int_{-1}^1 x e^x \, dx & \text{f) } \int_{-1}^1 x \ln(x^2 + 1) \, dx & \text{g) } \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 5x + 6} \, dx & \text{h) } \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 4x + 4} \, dx \end{array}$$

### Oppgave 3.

Løs integralet  $\int_1^2 1/x \, dx$ . Estimer deretter arealet under grafen til  $y = 1/x$  i intervallet  $I = [1, 2]$  ved hjelp av en Riemann-sum med  $n$  delintervaller:

$$\text{a) } n = 2 \qquad \text{b) } n = 4 \qquad \text{c) } n = 8$$

### Oppgave 4.

Regn ut det bestemte integralet  $\int_0^2 (x^3 - 3x + 1) \, dx$ , og forklar at svaret kan tolkes som  $A_1 - A_2 + A_3$ , der  $A_1, A_2, A_3$  er arealet av tre områder  $R_1, R_2, R_3$  i  $xy$ -planet begrenset av grafen til  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  og  $x$ -aksen. Vis så disse områdene på en figur. En grov skisse er nok.

### Oppgave 5.

La  $R$  være området begrenset av grafen til  $y = \ln(2 + x)$ , linjen  $y = 2$ , og  $y$ -aksen. Tegn inn området  $R$  på en figur, og regn ut arealet til  $R$ .

### Oppgave 6.

La  $R$  være området begrenset av grafene til  $y = x$  og  $y = x^2$ . Tegn inn området  $R$  på en figur, og regn ut arealet til  $R$ .

### Oppgave 7.

Løs de (uegentlige) integralene nedenfor. Tolk hvert integral som et areal, og tegn figur.

$$\text{a) } \int_1^\infty 1/x \, dx \qquad \text{b) } \int_1^\infty 1/x^2 \, dx \qquad \text{c) } \int_0^1 -\ln x \, dx \qquad \text{d) } \int_0^1 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx \qquad \text{e) } \int_0^\infty \frac{e^{1-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$$

### Oppgave 8.

Bestem arealet under grafen til  $y = 1/x$  i intervallet  $I = [1,2]$ , og bruk dette til å vise at

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-1} \right) = \ln(2)$$

### Oppgave 9.


Eksamen MET11807 12/2019

Regn ut disse integralene:

a) (6p)  $\int 30x\sqrt{x} \, dx$

b) (6p)  $\int xe^{-x} \, dx$

c) (6p)  $\int \frac{6-3x}{4-9x^2} \, dx$



d) (6p) Grafen til en funksjon  $f$  er vist i figuren ovenfor. Bestem arealet  $A_1$  når det er oppgitt at arealet  $A_2 = 22/15$  og at

$$\int_{-2}^1 f(x) \, dx = \frac{18}{5}$$

### Oppgave 10.

Oppgaver fra læreboken: 5.6.1 - 5.6.5, 5.7.1 - 5.7.2

## Svar på veiledningsoppgaver

### Oppgave 1.

- |          |          |          |              |                 |
|----------|----------|----------|--------------|-----------------|
| a) $1/2$ | b) $1/3$ | c) $1/4$ | d) $e - 1$   | e) $e - 1/e$    |
| f) $0$   | g) $2/3$ | h) $0$   | i) $e - 1/e$ | j) $2(e - 1/e)$ |

### Oppgave 2.

- |          |                   |                        |          |
|----------|-------------------|------------------------|----------|
| a) $1$   | b) $\ln(2) - 1/2$ | c) $2\ln(3) - 3\ln(2)$ | d) $1/6$ |
| e) $2/e$ | f) $0$            | g) $\ln(3) - \ln(2)$   | h) $2/3$ |

**Oppgave 3.**

Det bestemte integralet er  $\int_1^2 1/x \, dx = \ln(2) \approx 0.693$ , og tilnærmingene er gitt ved:


a)  $0.5 \cdot 1/1 + 0.5 \cdot 2/3 \approx 0.833$

b)  $0.25 \cdot 1/1 + 0.25 \cdot 4/5 + 0.25 \cdot 2/3 + 0.25 \cdot 4/7 \approx 0.760$

c)  $0.125 \cdot 1 + 0.125 \cdot 8/9 + 0.125 \cdot 4/5 + 0.125 \cdot 8/11 + 0.125 \cdot 2/3 + 0.125 \cdot 8/13 + 0.125 \cdot 4/7 + 0.125 \cdot 8/15 \approx 0.725$

**Oppgave 4.**

Det bestemte integralet er  $\int_0^2 (x^3 - 3x + 1) \, dx = 0$ . Grafene til  $f$  er vist nedenfor, og vi ser at områdene  $R_1$  and  $R_3$  ligger over  $x$ -aksen mens  $R_2$  ligger under. Derfor er  $A_1 - A_2 + A_3 = \int_0^2 (x^3 - 3x + 1) \, dx = 0$ .

**Oppgave 5.**

$e^2 - 6 + \ln(4)$

**Oppgave 6.**

$1/6$

**Oppgave 7.**

a)  $\infty$

b) 1

c) 1

d)  $2e - 2$

e)  $2e$

**Oppgave 8.**

Arealet er  $\ln(2)$ , og Riemann-summen for dette arealet med  $n$  delintervaller er

$$\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1} + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+1/n} + \dots + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+(n-1)/n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{n+1} + \dots + \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-1}$$

Grenseverdien til denne summen når  $n \rightarrow \infty$  er derfor lik arealet  $\ln(2)$ .

**Oppgave 9.**

a) Vi skriver  $x\sqrt{x} = x^{3/2}$  som en potens, og bruker potensregelen for derivasjon:

$$\int 30x\sqrt{x} \, dx = \int 30x^{3/2} \, dx = 30 \frac{2}{5} x^{5/2} + C = 12x^2\sqrt{x} + C$$

b) Vi bruker delvis integrasjon med  $u' = e^{-x}$  og  $v = x$ , som gir  $u = -e^{-x}$  og  $v' = 1$ , og dermed

$$\int x e^{-x} dx = -e^{-x} \cdot x - \int -e^{-x} \cdot 1 dx = -x e^{-x} + \int e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} + C$$

c) Vi faktorerer nevner som  $4 - 9x^2 = (2 + 3x)(2 - 3x)$ , og forenkler integranden (uttrykket som skal integreres) ved delbrøksoppspaltning. Dette gir

$$\frac{6 - 3x}{4 - 9x^2} = \frac{A}{2 + 3x} + \frac{B}{2 - 3x} \Rightarrow 6 - 3x = A(2 - 3x) + B(2 + 3x)$$

Det vil si  $6 - 3x = (2A + 2B) + (3B - 3A)x$ , eller at  $2A + 2B = 6$  og  $3B - 3A = -3$ . Dette lineære systemet kan skrives  $A + B = 3$  og  $B - A = -1$ , som gir  $2B = 2$  ved addisjon av likningene, eller  $B = 1$  og  $A = 2$ . Integralet blir dermed

$$\int \frac{6 - 3x}{4 - 9x^2} dx = \int \frac{2}{2 + 3x} + \frac{1}{2 - 3x} dx = \frac{2}{3} \ln|2 + 3x| - \frac{1}{3} \ln|2 - 3x| + C$$

d) Vi har at deler opp integralet, og uttrykker det ved hjelp av arealene  $A_1$  og  $A_2$ . Dette gir

$$\int_{-2}^1 f(x) dx = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = A_1 - A_2$$

siden  $f(x) > 0$  i intervallet  $(-2,0)$  og  $f(x) < 0$  i intervallet  $(0,1)$ . Vi løser likningen for  $A_1$ , og dette gir

$$A_1 = \int_{-2}^1 f(x) dx + A_2 = \frac{18}{5} + \frac{22}{15} = \frac{76}{15} \approx 5.07$$

### Oppgave 10.

Fullstendig løsning av oppgaver fra læreboken [E] finnes i oppgaveboken [O].